

# Doskort Toujeo

insulin glargin 300E/ml

## START / TITRERING

### Rekommenderad startdos:

#### Patienter med T1DM

Toujeo ska användas en gång dagligen tillsammans med ett måltidsinsulin och kräver individuell dosanpassning.


#### Patienter med T2DM

Rekommenderad startdos är 0,2 enheter/kg följt av en individuell dosanpassning.

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering.

- Titring baseras på patientens FPG-värden
- Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag
- Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag



## BYTE FRÅN ANNET BASINSULIN

Vid endos annat basinsulin ► ge samma dos Toujeo\*  
OBS! ingen dosomräkning behövs.

Vid tvådos annat basinsulin ► minska totaldosen med 20% och ge endos Toujeo.

**Exempel:** 20 + 20 enheter annat basinsulin. Minska med 20% = 32 enheter Toujeo.

Individuell titring till önskat behandlingsmål.

\*Byte från Lantus till Toujeo kan göras enhet för enhet, men en högre dos av Toujeo (ungefär 10-18%) kan krävas för att uppnå målintervallet för plasmaglukos.

## BYTE FRÅN MIXINSULIN

Räkna ut basinsulindosen. Starta med 80% av uträknad dos i endos Toujeo. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns. Titra upp Toujeodosen.

**Exempel:** 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70. Räkna ut 70% av totalt 40 enheter = 28 enheter basinsulin. 80% av dessa 28 enheter = 22 enheter Toujeo.

# Doskort Toujeo

## INSULINPENNA OCH KANYLER



**SoloSTAR** Förfylld insulinpenna, 1-80 enheter per injektion. Dosjusteras 1 E åt gången.

**Vnr. 47 91 86** (5 x 1,5ml) **Vnr: 17 38 97** (10 x 1,5ml).



**DoubleSTAR** Förfylld penna, 2-160 enheter per injektion. Dosjusteras 2 E åt gången.

**Vnr. 57 74 06** (3 x 3ml).

## OMVANDLINGSTABELL FÖR RECEPT

Antal enheter per dag	Antal förpackningar för 3 månaders förbrukning
1 - 25	1
26 - 50	2
51 - 75	3
76 - 100	4

**Toujeo**<sup>®</sup> (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning. Långverkande insulinanalog. R, (F), A10AE04. **Indikation:** Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder.

**Varningar och försiktighet:** Toujeo ska ej användas för behandling av diabetesketoacidosis. För ytterligare information och prisuppgift, se [www.fass.se](http://www.fass.se). **Kontaktuppgifter:** Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, [www.sanofi.se](http://www.sanofi.se). Vid frågor kontakta:

[infoavd@sanofi.com](mailto:infoavd@sanofi.com). Datum för senaste översyn av produktresumén; november 2021. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

**För mer information om diabetes och diabetesbehandling gå in på [www.toujeo.se](http://www.toujeo.se)**

**sanofi**